

ESWL（体外衝撃波碎石術）を受けられる方へ

主治医

主治医以外の担当者

担当看護師

担当薬剤師

担当栄養士

患サポチェック：

患者さん氏名：

様

	入院日/手術当日		退院日
	手術前	手術後	
治療 処置 検査	<ul style="list-style-type: none"> 入院後より点滴をします(脱水予防と治療効果のため) (点滴をする前に手術着に着替えます) 手術に行く前に痛み止めの座薬を入れます 術中に静脈麻酔の点滴を行います 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 禁飲食 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後 1 時間で飲食可能となります 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 
薬	<ul style="list-style-type: none"> 常用薬は入院前に患者サポートセンターで薬剤師が確認します 	<ul style="list-style-type: none"> 食事再開と共に常用薬が再開になります 抗血小板薬は再開制限があります 	
排泄		<ul style="list-style-type: none"> 手術終了後、最初の尿の性状を確認します 	
活動 清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入れ歯、アクセサリ、コンタクト、貼付物等はずし、手術着に着替えてください 歩いて手術室に入室します 	<ul style="list-style-type: none"> 車いすで帰宅します 手術後 1 時間はベッド上安静です シャワー浴可 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴可 
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> 病棟や病室内の説明があります 看護師が病歴などを聞きます 手術の順番になりましたら歩いて手術室へ行きます 手術室全体の進行状況によって、入室時間が大幅に遅れることがあります 	<ul style="list-style-type: none"> 碎石時に治療部位の尿路に影響が及び、血尿がでることがあります 手術後の痛みが強い場合、鎮痛薬を使用します 	<p>《退院の目安》</p> <ul style="list-style-type: none"> 手術後の血尿が許容範囲内で異常な腹痛、背部痛がなければ可能です 手術後の血尿が強かったり、腹痛、背部痛があるときはエコーやCT検査を行います <p>《退院後の注意点》</p> <ul style="list-style-type: none"> 尿路感染の予防と排石を促すために 1 日 1.5 L 以上を目安に積極的に水分を摂りましょう 退院前より濃い血尿が出た場合、異常な腹痛、背部痛を自覚した場合ご連絡ください <p style="text-align: center;">連絡先 03-3625-6381</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> パジャマやタオルなどレンタルもご用意しています 	 	<p style="text-align: center;">上記、入院中の療養計画について説明を受けました。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p>本人または家族の署名</p>

特別な栄養管理の必要性： 有 無

DPC 説明済

※この経過内容は、当院での標準的な診療内容を記載しています。経過には個人差があるため、この経過通りに進まないことがあります、その都度対応しますのでご安心ください。